

Неспецифическая защита от укуса клеща



- При посещении леса необходимо надевать защитную одежду, чтобы исключить попадание клеща на открытые участки тела
- Использовать отпугивающие клещей средства (репелленты), которые наносят на одежду или открытые участки тела
- Каждые 15-20 минут осматривайте себя и своих спутников, вернувшись домой, тщательно проверяйте одежду и все тело
- Стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах
- Тщательно осматривайте собак после выгула
- Если Вы живете в частном доме – проводите регулярную расчистку участка от сухостоя, валежника, мусора, скашивание травы

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ



Обращайтесь за медицинской помощью как можно раньше. Помните, чем раньше вводится иммуноглобулин, тем эффективность его выше!

За медицинской помощью необходимо обращаться в ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница» (г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54-а)



Департамент здравоохранения
Администрации города Тюмени

Будьте здоровы!

Способы защиты от клещевого вирусного энцефалита

ВАКЦИНАЦИЯ

Схема вакцинации клещевого энцефалита состоит из 3-х доз, которые вводятся по определенной схеме, согласно инструкции по применению препарата; ревакцинация проводится каждые 3-4 года. После стандартного первичного курса из 3-х прививок иммунитет сохраняется в течение 3-5 лет.



Когда можно прививаться? Прививаться можно круглый год. Предпочтительнее начинать заблаговременно (осенью). Через год (после второй прививки) делают ревакцинацию. **Весной и летом применяют экстренную схему вакцинации, когда интервал между прививками сокращается.**

Все вакцины взаимозаменяемы. Иммунизация создает стойкий иммунитет против заражения любым вирусом клещевого энцефалита. Эффективность зарубежных вакцин в России подтверждена.

Будьте здоровы!



Департамент здравоохранения
Администрации города Тюмени